

靜脈曲張血管手術衛教單張

術前準備

- 徹底清潔手術患肢
- 按時服用平日的慢性病藥物
- 血壓和體溫若有異常請告知醫護人員
- 為自費手術，治療費用單腳約7-9萬，同時治療雙腳約9-11萬，實際費用會依手術當天實際使用材料有所增減，若有住院需求，請提前告知

術中進行

- 通常以下肢局部腫脹麻醉下進行，消除疼痛及恐懼感
- 病變靜脈週邊以超音波導引進行局部腫脹麻醉
- (雷射/射頻)導管以超音波導引穿刺置入主病灶(大隱或小隱)血管進行燒灼
- 分枝血管膨大處會以血管內藥物(硬化劑)注射治療或是微創血管摘除術

術後照護

- 術後穿刺傷口請勿泡水並保持乾燥至少3天
- 前二十四小時勿脫掉彈性襪，療程完全結束後可不需再穿彈性襪
- 術後當天即可行走，正常活動，離院返家
- 術後會有輕微瘀青、局部傷口疼痛、感覺異常或腿部緊繃感皆屬正常現象，通常在一兩周後會慢慢改善
- 燒灼之血管病灶有血栓形成，或有異物感為正常，數星期會漸緩解

可能發生之合併症或風險

症狀	發生機會
• 下肢瘀青	有時會發生
• 靜脈曲張復發	少
• 傷口感染	極少
• 深部靜脈栓塞	極少



關懷專線：0975425034

靜脈曲張健康網：<http://www.varicose-health.com>