

靜脈曲張血管燒灼手術衛教單張

術前準備

- 徹底清潔手術患肢
- 按時服用平日的慢性病藥物（抗血小板如阿斯匹靈請停藥 5 日）
- 血壓和體溫若有異常請告知醫護人員
- 手術費用 6-8 萬靜脈燒灼（雷射 / 射頻）及血管內硬化劑治療

術中進行

- 通常以下肢局部腫脹麻醉下進行，消除疼痛及恐懼感
- 病變靜脈週邊以超音波導引進行局部腫脹麻醉
- 燒灼（雷射 / 射頻）導管以超音波導引穿刺置入主病灶（大隱或小隱）血管進行燒灼
- 分枝血管膨大處會以血管內藥物（硬化劑）注射治療或是微創血管摘除術

術後照護

- 術後穿刺傷口請勿泡水並保持乾燥至少 3 天
- 前二十四小時勿脫掉彈性襪，兩週內請白天穿著醫療用彈性襪（術後會為您準備）
- 術後當天即可行走，正常活動，離院返家
- 術後會有輕微瘀青、局部傷口疼痛、感覺異常或腿部緊繃感皆屬正常現象，通常在一兩周後會慢慢改善
- 燒灼之血管病灶有血栓形成，或有異物感為正常，數星期會漸緩解

可能發生之合併症或風險

- 下肢血腫瘀青
- 傷口感染
- 深部靜脈栓塞
- 靜脈曲張復發

關懷專線：0975425034

